

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	MigRep	-	-
categoria	VU	-	-

Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)



Perdiz-do-mar



Taxonomia

Aves, Charadriiformes, Glareolidae.

Tipo de ocorrência

Estival nidificante.

Classificação

VULNERÁVEL – VU (D1)

Fundamentação: Espécie com população reduzida (admitindo-se que seja inferior a 1.000 indivíduos maduros).

Distribuição

Ocorre na Europa do Sul, Médio Oriente e África. A subespécie que ocorre em Portugal nidifica no Sul da Europa, Mediterrâneo, Mar Negro e Cáspio até ao Cazaquistão e Paquistão. Inverna na África subsariana.

Em Portugal Continental distribui-se pelo Sul, principalmente no Estuário do Tejo e Sado, Alentejo e Algarve (Rufino 1989, Farrobo & Leitão 1997, ICN dados não publicados).

População

As estimativas mais recentes indicam a existência de 315-550 casais (Farrobo & Leitão 1997).

Em termos de estatuto de ameaça a nível da Europa, a espécie é considerada *Em Declínio*, apresentando um declínio continuado moderado (BirdLife International 2004).

Habitat

Áreas planas e abertas, principalmente campos agrícolas e estepes, geralmente perto de água. Pode também utilizar campos de arroz e salinas.

Factores de Ameaça

Perda ou degradação de habitat (por acção do Homem), intensificação agrícola, uso de pesticidas, mudanças da gestão agrícola, secas, drenagem de campos e perturbação humana (*e.g.* espantamentos em áreas de arrozal) constituem as principais ameaças à conservação desta espécie.

Medidas de Conservação

Várias zonas de ocorrência da espécie foram recentemente designadas como *Zonas Importantes para as Aves* (Costa *et al.* 2003). No entanto, é necessário uma monitorização mais eficaz, de modo a obter estimativas mais fiáveis da sua abundância e distribuição. Importa assegurar a gestão do regime de utilização do solo e diminuição da perturbação humana.